



كزيتريم

أبريبتان

كبسولة 80 مغ و 125 مغ

1- الشكل و التقديم:

كزيتريم: كبسولة، علية ذات 03 كبسولات، (كبسولتين دواتي 80 مغ و كبسولة ذات 125 مغ).

2- التركيب:

تحتوي كل كبسولة على:

كزيتريم 80 مغ: أبريبتان..... 80.مغ

كزيتريم 125 مغ: أبريبتان..... 125.مغ

السواغات:

سيليلوز بلوري دقيق، كبريتات لوريل الصوديوم، سكروز.

كبسولة **كزيتريم 80 مغ:** أرووبين/كارموزين، أزرُق لامع/FCF & FD&C أزرق # 1، أكسيد الحديد الأحمر، أكسيد الحديد الأصفر، ثاني أكسيد التيتانيوم، جيلاتين. كبسولة **كزيتريم 125 مغ:** أرووبين/كارموزين، أزرُق لامع/FCF & FD&C أزرق # 1، كينولين أصفر، ثاني أكسيد التيتانيوم، جيلاتين.

سواغات ذات أثر معلوم:

سكروز

أرووبين/كارموزين

صوديوم

3- الصنف العلاجي:

هذا الدواء عبارة عن مضاد للقيء و مضاد للغثان الذي ينتمي إلى مجموعة مناهضات مضغقلبات نيوروكينين 1 (NK1).

4- سواغات الإستعمال:

يستخد **كزيتريم** عند البالغين والمراهقين ابتداء من سن 12 سنة، **إلى جانب أدوية أخرى** للوقاية من الغثان والقيء الناجمين عن العلاج الكيماوي (علاج السرطان) الذي يسبب غثانًا وتقيئًا شديداً ومتوسطان (مثل سيسبلاتين، سيكلوفوسفاميد، دوكسوروبيسين أو إبيروبيسين).

5- مقدار الجرعة و طريقة الإستعمال:

مقدار الجرعة:

الجرعة التي تعطى عن طريق الفم الموصى بها **لكزيتريم** هي:

اليوم 1:

كبسولة ذات 125 مغ.

اليوم 2 و 3:

كبسولة ذات 80 مغ يومياً.

بعد العلاج بكزيتريم، قد يطلب منك طبيبك أو من الطفل الإستمرار في تناول أدوية أخرى، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات (مثل ديكساميثازون) ومضاد 5-HT3 (مثل أودانسترون) للوقاية من الغثان والتقيؤ.

طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم

يمكن تناول **كزيتريم** مع أو من دون طعام، إبتلع الكبسولة بأكملها مع سائل.

في حالة العلاج الكيماوي، تناول **كزيتريم** قبل بدء جلسة العلاج الكيماوي بساعة واحدة.

في حالة عدم الخضوع لعلاج كيماوي، تناول **كزيتريم** في الصباح ويؤخذ كبسولة في نفس الوقت مع الأدوية الأخرى للوقاية من الغثان و التقيؤ.

احترموا دائماً مقدار الجرعة الموصوفة من قبل طبيبك.

6- موانع الإستعمال:

لا يجب إستعمال **كزيتريم** في الحالات التالية :

إذا كانت لديكم حساسية من الأبريبتان أو من أحد مكونات هذا الدواء.

مع الأدوية التي تحتوي على البيوريد (يستخدم لعلاج الأمراض النفسية)، الترفينادين و الأستيemizول (يستخدمان لعلاج التهاب الأنف التحسسي (حصى الفش) و الحساسيات الأخرى)، السيزبريد (يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي).

اعلموا الطبيب إذا كنتم أو الطفل تتناولون هذه الأدوية، لأنه من الضروري تغيير العلاج قبل بدء تناول **كزيتريم**.

في حالة الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

7- تحذيرات خاصة و احتياطات الإستعمال:

قبل بدء العلاج ب**كزيتريم** ، أخبروا طبيبك إذا كنتم أنتم أو الطفل مصابون بمرض في الكبد لأن الكبد مهم لتفكيك الدواء في الجسم، لذلك، قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة حالة كبدكم أو كبد الطفل.

إذا أخبركم طبيبك أن لديكم عدم القدرة على تحمل بعض السكريات، إتصلوا به قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على صبغة أزوتية (E122)، و من الممكن أن يسبب تفاعلات حساسية.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميلي مول (23 مغ) من الصوديوم في الجرعة الواحدة أي أنه أساسا خالي من الصوديوم.

الاطفال و المراهقين:

لا يعطى **كزيتريم** للأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة حيث لم يتم دراسته عند هذه الفئة العمرية.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

8- التفاعلات مع أدوية أخرى:

لتفادي التفاعلات الممكنة بين عدة أدوية، ينبغي إعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي علاج آخر قيد الاستعمال حتى إن كانت أدوية معطاة من دون وصفة.

يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي عن تناول إحدى الأدوية التالية:

قد لا تعمل موانع الحمل بشكل جيد، و التي قد تشمل الحبوب و اللصقات الجلدية و الغرسات وبعض الوالاب الرحمية التي تفرز الهرمونات، عند إستخدامها مع **كزيتريم** يجب إستخدام طريقة غير هرمونية بديلة أو تكميلية لمنع الحمل أثناء علاج **كزيتريم** و لمدة تصل إلى شهرين بعد تناول **كزيتريم**.

-البيوريد (يستخدم لعلاج الأمراض النفسية)،

-التريفينادين و الأستيemizول (يستخدم لعلاج التهاب الأنف التحسسي (حصى الفش) و ردود أفعال تحسسية أخرى).

-سيزبريد (يستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي)، الألفيتايل و فيتايل (يستخدمان لعلاج الألم).

-الأدوية التي تحتوي على قلواني نظير مشتق من فطر الشقران مثل الإريغوتامين و الديرجوتامين (يستخدم لعلاج الصداع النصفي)،

-الريفامبيسين، الكلاريثروميسين، التيليثروميسين (مضادات حيوية تستخدم لعلاج الإلتهابات).

-الفينيتوين (دواء يستخدم لعلاج الاختلاج)،

-الكارامازيبين (يستخدم لعلاج الاضطراب الاكتئابي والصرع)،

-الميدازولام، الترازولام، الفينوباريثال (أدوية مستخدمة للتهدئة و المساعدة على النوم).

-نبتة العرن المنقوب (مستحضر عشبي يستخدم لعلاج الاضطراب الاكتئابي)،

-مضطبات البروبان (المستخدمة في علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية)،

-النييفارادون (يستخدم لعلاج الاضطراب الاكتئابي)،

-الكيثوكوتازول (مادة معاد على شكل الشامبو (يستخدم لعلاج متلازمة كوشينغ - عندما ينتج الجسم الكورتيزول بطريقة مفرطة).

-الإيتراكونازول ، الفوريكوتازول ، البوزاكونازول (مضادات الفطريات).

-الكورتيكويد (مثل الديكساميثازون).

-السيكلوسبورين و التاكروليموس و السيربوليموس و الإيفيروليموس (مضطبات المناعة) .

-الكينيدين (تستخدم لعلاج الإضطراب في معدل ضربات القلب).

-الإرينوتيكان، الإيتوبوزيد، الفينوريلين، الإيفوسفاميد (أدوية تستخدم لعلاج السرطان).

-الورافارين و الأسيينوكومارول (مضادات التخثر: قد يكون من الضروري أخذ عينات دموية).

-الأدوية المضادة للقلق (مثل الألبرازولام).

-التولوتاميد (دواء يستخدم لعلاج مرض السكري).

9- الحمل و الرضاعة:

الحمل:

لا يجب إستخدام هذا الدواء خلال فترة الحمل، إلا في حالة الضرورة القصوى. إن كنت حامل، إن كنت تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل، يرجى استشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

كزيتريم قد يقلل من فعالية موانع الحمل الهرمونية حتى خلال 28 يوماً بعد تناوله تناول هذا الدواء.

لا تعلم إذا كان **كزيتريم** يُعزز في حليب الأم، لذلك لا ينصح بالرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا الدواء.

بصفة عامة، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء أثناء الحمل و الرضاعة.

10- السائقين ومستعملي الآلات :

من الجدير بالذكر أنه قد تحدث دوخة ونعاس لدى بعض الأشخاص بعد تناول **كزيتريم**، إذا شعرتُم أنتم أو الطفل بالدوخة أو النعاس ، فعليكم تجنب القيادة أو ركوب الدراجات أو إستخدام الآلات أو الأدوات بعد تناول هذا الدواء.

11- الآثار غير المرغوبة:

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب **كزيتريم** آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص: قد تجربها على أساس البيانات المتاحة): هذه علامات لرد فعل تحسسي.

تم الإبلاغ عن آثار جانبية أخرى والمذكورة أدناه.

الآثار غير المرغوبة الشائعة:

زيادة كمية إنزيمات الكبد في الدم (ALAT) ،

نقص الشهية، فواق.

-إمساك، صداع، صعوبة في الهضم، الإرهاق.

الآثار غير المرغوبة غير الشائعة:

ألم في الجزء العلوي من المعدة، جفاف الفم، غثيان، غازات،

-إضطرابات بصرية، صعوبة في الكلام،

فلق، دوخة، نعاس

فقر الدم، حصى نقص العدلات

-خفقان، هبات حرارية، تشنؤ، تقيؤ، إرتجاع معدي مريئي، طفح جلدي، حب الشباب،

إخراج بول غير طبيعي، وهن، توعك.

زيادة ناقلة أمين السليارات aminotransférase (ASAT)، زيادة الفوسفاتاز القلبية

في الدم.

الآثار غير المرغوبة النادرة:

-متلازمة ستيفنز جونسون / متلازمة ليل (تفاعل جلدي وخيم نادر)

-السفاد، عدوى بالمكورات العنقودية،

-العطش الشديد،

-الإلتهاب الكيماوي،

-تغيير في التدفق،

نوم عميق،

-إضطراب معرفي،

-إلتهاب المتلحمة،

ظنين في الأذنين، إضطرابات القلب والأوعية الدموية، بطء في ضربات القلب،

سعال ، إمزازات أنفية خفيفة، تهيج في الحلق، عطس، ألم بلعومي،

الحساسية للضوء، فرط التعرق،

آفة جلدية؛ طفح،

ضعف العضلات، تشنؤ العضلات،

-وذمة وعائية، إزجاج في الصدر، إضطراب في المشي،

-إنخفاض مستوى الصوديوم في الدم،

-تفاعل إيجابي للحللياء الحمراء في البول،

-فقدان الوزن، إِنْخِافُ في عدد الخلايا البيضاء المتعادلة،

-وجود الجلوكون في البول، زيادة كمية و تواتر البول،

-إنتفاخ القرحة الهضمية، صلابة البراز، إلتهاب القولون الأيمن،

-إفراز مفرط للدهون،

-إلتهاب الغشاء المخاطي للفم،

ظهور بثور أو بقع حمراء بشكل مفاجئ وعابر.

الآثار غير المرغوبة غير محددة التكرار:

حكة ، شرى،

فرط التحسس بما في ذلك الإرعوار.

الإبلاغ عن الآثار غير المرغوبة المشبهة بها:

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا ينطبق أيضًا على أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة من خلال نظام الإبلاغ.

المركز الوطني للبيظة الدوائية وتأثير المواد (CNPM).

- الموقع الإلكتروني: www.cnpm.org.dz

12- الجرعة الزائدة:

لا تأخذ كبسولات أكثر مما أوصى به طبيبك. إذا تناولت أنت أو الطفل الكثير من الكبسولات، اتصل بطبيبك على الفور.

13- نسيان جرعة أو عدة جرعات:

إذا نسيتم أنت أو الطفل جرعة، استشير طبيبك.

14- الحفظ:

يحفظ داخل العبوة الخارجية الأصلية. في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م بعيدا عن الرطوبة. لا يترك في متناول الأطفال.

لا يستعمل بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة.

القائمة ا

مقرر التسجيل رقم: K 230/447 23/05



صاحب مقر التسجيل : مخازن بيكر، حي عيسات إيندر، الدار البيضاء، الجزائر
الموقع : مخازن بيكر، م.ب.ن، إصالة للدار البيضاء، حي قاضية نسور رقم 18 الدار البيضاء، الجزائر
16100 الجزائر
مخازن بيكر، المنطقة الصناعية واد السمار، رقم 06، 16100، الجزائر، الجزائر

تاريخ مراجعة النشرة: ماي 2024



XETREME®

Aprépitant

Gélule 80 mg et 125 mg

1- FORME ET PRESENTATION:

XETREME® : Gélule. Boîte de 03 gélules.
(02 gélules à 80mg et 01 gélule à 125 mg.)

2- COMPOSITION:

Chaque gélule contient:

XETREME® 80 mg

Aprépitant.....80 mg.

XETREME® 125 mg

Aprépitant.....125 mg.

Excipients:

Cellulose microcristalline, sodium lauryl sulfate, saccharose.

Capsule de **XETREME® 80 mg**: Azorubine/carmoisine, bleu brillant FCF/ FD&C Bleu #1, oxyde de fer azuré, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane, gélatine.

Capsule de **XETREME® 125 mg**: Azorubine/carmoisine, bleu brillant FCF/ FD&C Bleu #1, jaune quinoléine, dioxyde de titane, gélatine.

Excipients à effet notoire:

Saccharose

Azorubine/carmoisine

Sodium

3- CLASSE THERAPEUTIQUE:

Ce médicament est un antiémétique et antinauséeux qui appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de la neurokinine 1 (NK1).

4- INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

XETREME® est utilisé chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans, en association avec d'autres médicaments pour prévenir les nausées et les vomissements causés par une chimiothérapie (traitement du cancer) qui entraîne des nausées et des vomissements importants et modérés (tels que cisplatine, cyclophosphamide, doxorubicine ou épirubicine).

5- POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Posologie:

La dose orale recommandée de **XETREME®** est:

Jour 1:

-Une gélule à 125 mg,

Jour 2 et 3:

-Une gélule à 80 mg par jour.

Après le traitement avec **XETREME®**, le médecin peut vous demander où à l'enfant de continuer à prendre d'autres médicaments, y compris un corticostéroïde (tel que la dexaméthasone) et un Antagoniste 5-HT3 (tel que l'ondansétron) pour la prévention des nausées et vomissements.

Mode d'administration:

Voie orale.

XETREME® peut être pris avec ou sans nourriture, Avalez la gélule entière avec du liquide.

-Si une chimiothérapie est administrée, prenez **XETREME®** une heure avant de commencer votre séance de chimiothérapie.

-Si aucune chimiothérapie n'est administrée, prenez **XETREME®** le matin.

-Prendre toujours **XETREME®** au même temps que d'autres médicaments pour éviter les nausées et les vomissements.

RESPECTEZ STRICTEMENT LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN.

6- CONTRE-INDICATIONS:

Ne prenez jamais **XETREME®**:

-Si vous êtes allergique à l'aprépitant ou à l'un des autres composants de ce médicament.

-Avec des médicaments contenant du pimozide (utilisé pour traiter les maladies psychiatriques), de la terféndine, l'astémizole (utilisés pour le rhume des foies et autres allergies) et le cisapride (utilisé pour traiter les problèmes digestifs).

Informez le médecin si vous ou l'enfant prenez ces médicaments; car le traitement doit être modifié avant de commencer à prendre **XETREME®**.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Avant de débuter le traitement par **XETREME®**, informez le médecin si vous ou l'enfant avez une maladie du foie car le foie est important pour dégrader le médicament dans le corps. C'est pourquoi le médecin peut avoir à surveiller l'état de votre foie ou du foie de l'enfant.

-Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

-Ce médicament contient un colorant azoïque (E122) et peut provoquer des réactions allergiques.

-Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement considéré comme sans sodium.

Enfants et adolescents:

Ne donnez pas **XETREME®** aux enfants âgés de moins de 12 ans car il n'a pas été étudié chez cette population.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8- INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants:

-Les contraceptifs, pouvant inclure les pilules, les patchs cutanés, les implants et certains dispositifs intra-utérins (DIU) qui libèrent des hormones, peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont utilisés avec **XETREME®**. Une méthode de contraception non hormonale alternative ou complémentaire doit être utilisée pendant le traitement par **XETREME®** et jusqu'à 2 mois après la prise de **XETREME®**.

-Le pimozide (utilisé pour traiter les maladies psychiatriques).

-La terféndine, l'astémizole (utilisés pour le rhume des foies et d'autres réactions allergiques).

-Le cisapride (utilisé pour le traitement des problèmes digestifs), Alfétafil et fetanyl (utilisé pour traiter la douleur).

-Les médicaments contenant des alcaloïdes dérivés de l'ergot de seigle tel que l'ergotamine et la diergotamine (utilisés pour le traitement des migraines).

-La rifampicine, la clarithromycine, la tétracycline (antibiotiques utilisés pour traiter les infections).

-La phénytoïne (un médicament utilisé pour traiter les convulsions).

-La carbamazépine (utilisée pour traiter la dépression et l'épilepsie).

-Le midazolam, le triazolam, le phénobarbital (médicaments utilisés pour calmer ou pour aider à dormir).

-Le millepertuis (une préparation à base de plantes utilisée pour traiter la dépression).

-Les inhibiteurs de protéase (utilisés pour traiter les infections VIH).

-La néfazodone (utilisée pour traiter la dépression).

-Le kétoconazole sauf en shampooing (utilisé pour traiter le syndrome de Cushing - lorsque le corps produit un excès de cortisol).

-L'itraconazole, le voriconazole, le posaconazole (antifongiques).

-Les corticoïdes (tels que la dexaméthasone et la méthylprédnisolone)

-Ciclosporine, tacrolimus, sirolimus et évérolimus (immunosuppresseurs).

-Quinidine (utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque)

-Inotécan, étoposide, vinorelbine, ifosfamide (médicaments utilisés pour traiter le cancer)

-Warfarine, acénocoumarol (anticoagulants: des prises de sang peuvent être nécessaires)

-Les médicaments anti-anxiété (tels que l'alprazolam)

-Tolbutamide (un médicament utilisé pour traiter le diabète).

9- GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Grossesse:

Vous ne devez pas utiliser ce médicament pendant la grossesse, sauf en cas de nécessité absolue. Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

XETREME® peut réduire l'efficacité des contraceptifs hormonaux même au cours des 28 jours qui suivent sa prise

Allaitement:

On ne sait pas si **XETREME®** est excrété dans le lait maternel; par conséquent, l'allaitement n'est pas recommandé pendant le traitement par ce médicament.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

10- CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES:

Il est à noter que des étourdissements et une somnolence peuvent survenir chez certains sujets après la prise de **XETREME®**. Si vous ou l'enfant ressentez des étourdissements ou une somnolence, vous devez éviter de conduire, de faire du vélo ou d'utiliser des machines ou des outils après la prise de ce médicament.

11- EFFETS INDESIRABLES:

Comme tous les médicaments, **XETREME®** est susceptible d'induire des effets indésirables chez certaines personnes:

Arrêtez de prendre XETREME® et consultez immédiatement un médecin si vous constatez un des effets indésirables suivants, pouvant être grave et pour lequel vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical en urgence:

-Urticaire, éruption cutanée, démangeaisons, difficultés à respirer ou à avaler (fréquence indéterminée, ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles); ce sont des signes d'une réaction allergique. D'autres effets indésirables ont été rapportés et sont mentionnés ci-dessous.

Les effets indésirables fréquents:

-Augmentation de la quantité d'enzymes hépatiques dans le sang (ALAT).

-Diminution d'appétit, hoquet

-Constipation, maux de tête, digestion difficile, fatigue.

Les effets indésirables peu fréquents:

-Douleur dans la partie supérieure de l'estomac, bouche sèche, nausées, flatulences,

-Troubles sensoriels, difficulté d'élocution,

-Anxiété, vertiges, somnolence

-Anémie, neutropénie fébrile.

-Palpitations, bouffées de chaleur, éruptions cutanées, vomissement, reflux gastro-œsophagien, éruption cutanée, acné, anomalie de l'évacuation de l'urine, asthénie, malaise.

-Augmentation de l'Aspartate aminotransférase (ASAT), augmentation de la phosphatase alcaline sanguine.

Les effets indésirables rares:

-Syndrome de Stevens-Johnson/syndrome de Lyell (rare réaction sévère cutanée).

-Candidose, infection staphylococcique

-Soif excessive

-Désorientation, humeur euphorique

-Altération du goût

-Sommeil profond

-Trouble cognitif

-Conjonctivite écoulement et démangeaisons oculaires

-Bourdonnements d'oreilles, troubles cardiovasculaires, ralentissement du rythme cardiaque

-Toux, écoulement retro nasal, irritation de la gorge, éternuements, douleur oro-pharyngée

-Photosensibilité, transpiration excessive

-Lésion cutanée,

-Faiblesse musculaire, spasmes musculaires

-Œdème, gêne thoracique, troubles de la démarche

-Diminution du taux de sodium dans le sang

-Réaction positive des globules rouges dans les urines

-Perte de poids, diminution du nombre de neutrophiles

-Présence du glucose dans les urines, augmentation du débit urinaire et la fréquence des mictions.

-Perforation d'ulcère duodénal, selles dures, inflammations du colon droit

-Sécrétion excessive du sébum

-Inflammation de la muqueuse buccale

-Apparition soudaine et passagère de boutons ou plaques rouges

Les effets indésirables à fréquence indéterminée:

-Prurit, urticaire

-Réaction d'hypersensibilité incluant des réactions anaphylactiques

Déclaration des effets indésirables suspectés:

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration: Centre National de Pharmacovigilance et de Matérovigilance (CNPM).

-Site internet: www.cnpm.org.dz

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

12- SURDOSAGE:

Ne prenez pas plus de gélules que ne l'a recommandé votre médecin. Si vous ou l'enfant avez pris trop de gélules, contactez immédiatement votre médecin.

13- OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES:

Si vous ou l'enfant avez oublié une dose, demandez conseil à votre médecin.

14- CONSERVATION

A conserver dans l'emballage externe d'origine, à une température ne dépassant pas 25°C à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Liste I

DE n° : 23/05 K 230/447



Détenteur de la DE : Laboratoires BEKER®, Cité Aissat Idir, Dar El Beida, Alger
Fabricant : Laboratoires BEKER® Z.A, extension Dar El Beida, cité Fatma N'Soumer N°18, Dar El Beida, 16100, Alger, Conditionneur : Laboratoires BEKER®, Zone industrielle de Oued S'mar, Lot N° 66, 16100, Alger, Algérie.

Date de dernière mise à jour : **Mai 2024**